

UKĄSZENIE PRZEZ ŻMIJĘ - CO ROBIĆ

 12.06.2018

 Redaktor

 Aktualności

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe już od kilku lat ma na wyposażeniu kilku podstawcji antytoksynę jadu żmii. Posiadanie tego preparatu nie jest obowiązkowe w karetkach, ale krakowskie pogotowie już parokrotnie w ciągu kilku ostatnich kilku lat ratowało osoby ukąszone przez żmije. Antytoksynę rozmieszczono w rejonach, gdzie ryzyko ukąszenia jest największe. Surowica może być podawana wyłącznie przez lekarza, a najlepiej, jeśli dzieje się to na oddziale szpitalnym. Dlatego mogą z niej korzystać wyłącznie zespoły specjalistyczne. Jej podanie może wiązać się z ryzykiem, np. wstrząsu. Dlatego lekarz musi ocenić wszystkie „za i przeciw”. W zależności od stanu pacjenta, czasem należy antytoksynę podać natychmiast, a czasem bezpieczniejszym rozwiązaniem jest nie podawanie preparatu, lecz szybki transport do szpitala. Antytoksyna musi być przechowywana w lodówce, nie może więc być wożona na stałe w karetkach. Surowica jest dostępna w pięciu miejscach stacjonowania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w rejonach, gdzie ukąszenia przez żmije zdarzają się dość często. **Jak postąpić w przypadku ukąszenia** W miejscu ukąszenia powstają dwa czerwone punkciki oddalone od siebie około 5-10 mm. Jad wprowadzony do organizmu działa toksycznie i alergicznie uszkadza śródbłonek naczyń, powoduje zaburzenia krzepnięcia krwi, uszkadza śródbłonek naczyń. Objawy towarzyszące ukąszeniu: -obrzęk -zaczerwienienie i zasinienie okolicy ukąszenia - ból okolicy ukąszenia -nudności -wymioty - biegunki - dreszcze -pocenie się -ogólne osłabienie -bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo - jelitowe - znużenie - senność - przyspieszenie akcji serca - spadek ciśnienia krwi - wstrząs Postępowanie w przypadku ukąszenia: - przemyć ranę wodą z mydłem - unieruchomić kończynę - starać się zachować spokój, nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, ponieważ sprzyja to wchłanianiu się jadu - nałożyć opatrunek chłodzący Nie należy: rozcinać rany, wysysać krwi ponieważ dodatkowo zainfekujemy ranę, nie przemywać rany spirytusem (wówczas dochodzi do koagulacji tkanek i jad nie może wypłynąć z rany), zakładać opaski uciskowej. Należy przewieźć poszkodowanego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego transportem własnym lub - w razie znaczącego pogarszania się stanu zdrowia, wezwać karetkę.



Źródło: <http://www.kpr.med.pl/aktualnosc/420.ukaszenie-przez-zmije-co-robic>